



La maladie de l'antracnose ne pénètre pas dans le fruit et laisse le cerneau blanc (malgré une coloration foncée) contrairement à la bactériose qui atteint le fruit et le liquéfie.



Protection contre l'antracnose du stade Df (individualisation des folioles) à Ff2 (pleine floraison):

- **Delan WG** : 0,05 kg/hl soit 1000 L/ha max (2 application max.) A appliquer avant période pluvieuse.
- **Systhane (curatif si mis 24h-48h après une pluie)** : 0,375 l./ha (3 applic max.)
- **(Bouillie bordelaise)** : En bio, un traitement peut être envisagé jusqu'au stade (Bf-Cf), Gonflement des bourgeons-Débourrement. Comme pour la bactériose, le cuivre a une action préventive et n'éradique pas la maladie. Utiliser 1,250 kg/hl, ne pas dépasser la dose autorisée de 4kg/ha/an soit 20 kg de bouillie. Possibilité d'ajouter du bore et du zinc + de la magnésie.)

Préférez l'alternance d'un produit afin d'éviter les risques de résistances. Ex: Faites une application de Delan et une de Systhane au lieu de trois applications de Systhane.

Cela est un schéma représentatif de la période de protection contre l'antracnose. Il est évolutif suivant les années et les conditions environnementales. Il est nécessaire d'établir un plan de protection avec le diagnostic de votre conseillère, suivant chaque parcelle (Pauline HOEFFERLIN : 06.15.73.74.27).